

Okoloustne zapalenie skóry



R-11083 Maść z iwermektyną i dimetykonem

Ivermectinum 0,5

Silolum 1,0

Aqua purificata

Unguentum Cholesteroli aa ad 50,0

M.f. cremor

DS. 1 x dziennie na zmienioną chorobowo skórę

*Termin przydatności do 7 dni w temp. 15-25°C,

*Termin przydatności do 14 dni w temp. 2-8°C, asept. NIE

Kopiuj recepturę



R-11077 Maść z iwermektyną i witaminą A

Ivermectinum 0,5

Vit.A 10 000 j.m.

Aqua purificata

Vaselini hydrophylici aa ad 50,0

M.f. cremor

DS. 1 x dziennie na zmienioną chorobowo skórę

Kopiuj recepturę

Świerzb

NGK Pharma





R-11067 Maść z ivermektyną przeciwświądowa

Ivermectinum	1,0
Procaini hydrochloridum	1,0
Aqua purificata	10,0
Unguentum Cholesteroli	ad 100,0

M.f. ung.

DS. Zastosować dwukrotnie na zainfekowaną powierzchnię, preparat powinien pozostawać na skórze co najmniej 8 godzin, po tym czasie zmyć ciepłą wodą.

Kopiuj recepturę



R-11065 Maść z ivermektyną

Ivermectinum	1,0
Adeps lanae	
Vaselini	aa ad 100,0

M.f. ung.

DS. Zastosować dwukrotnie na zainfekowaną powierzchnię, preparat powinien pozostawać na skórze co najmniej 8 godzin, po tym czasie zmyć ciepłą wodą.

Kopiuj recepturę

Trądzik

NGK Pharma





R-11072 Mleczko z brymonidyną i iwermektyną

Ivermectinum	1,0
Brimonidini tartaras	0,5
Lekobaza apteczna	20,0
Aqua purificata	ad 100,0

M.f. lotio

DS. 1 x dziennie na skórę twarzy

*Termin przydatności do 7 dni w temp. 15-25°C

*Termin przydatności do 14 dni w temp. 2-8°C, asept. NIE

Kopiuj recepturę



R-11070 Krem z iwermektyną

Ivermectinum	1,0
Ureum	5,0
Lekobaza Lux Apteczna	ad 100,0

M.f. cremor

DS. Zastosować dwukrotnie na zainfekowaną powierzchnię, preparat powinien pozostawać na skórze co najmniej 8 godzin, po tym czasie zmyć ciepłą wodą.

Kopiuj recepturę

Zapalenie brzegów powiek



R-11090 Maść na brzegi powiek z iwermektyną

0,5% Unguentum Ivermectini 10,0

M.f. ung. oph.

DS. 1 x dziennie na brzeg i powiek

*Termin przydatności do 30 dni w temp. 15-25°C, asept. TAK

Kopij recepturę



R-11087 Maść z iwermektyną i metronidazolem

Ivermectinum 0,02

Metronidazolium 0,2

Eucerinum anhydricum ad 20,0

M.f. ung. oph.

DS. 1 x dziennie na brzegi powiek

*Termin przydatności do 30 dni w temp. 15-25°C, asept. TAK

Kopij recepturę