

Przykładowe





R-11090 Maść na brzegi powiek z iwermektyną

0,5% Unguentum Ivermectini 10,0

M.f. ung. oph.

DS. 1 x dziennie na brzeg i powiek

*Termin przydatności do 30 dni w temp. 15-25°C, asept. TAK

Kopiuj recepturę



R-11087 Maść z iwermektyną i metronidazolem

Ivermectinum 0,02

Metronidazolium 0,2

Eucerinum anhydricum ad 20,0

M.f. ung. oph.

DS. 1 x dziennie na brzegi powiek

*Termin przydatności do 30 dni w temp. 15-25°C, asept. TAK

Kopiuj recepturę



R-11083 Maść z iwermektyną i dimetykonem

Ivermectinum 0,5

Silolum 1,0

Aqua purificata

Unguentum Cholesteroli aa ad 50,0

M.f. cremor

DS. 1 x dziennie na zmienioną chorobowo skórę

*Termin przydatności do 7 dni w temp. 15-25°C,

*Termin przydatności do 14 dni w temp. 2-8°C, asept. NIE

Kopiuj recepturę



R-11077 Maść z iwermektyną i witaminą A

Ivermectinum 0,5

Vit.A 10 000 j.m.

Aqua purificata

Vasellini hydrophyllici aa ad 50,0

M.f. cremor

DS. 1 x dziennie na zmienioną chorobowo skórę

Kopiuj recepturę



R-11072 Mleczko z brymonidyną i iwermektyną

Ivermectinum 1,0

Brimonidini tartaras 0,5

Lekobaza apteczna 20,0

Aqua purificata ad 100,0

M.f. lotio

DS. 1 x dziennie na skórę twarzy

*Termin przydatności do 7 dni w temp. 15-25°C

*Termin przydatności do 14 dni w temp. 2-8°C, asept. NIE

Kopiuje recepturę



R-11070 Krem z iwermektyną

Ivermectinum 1,0

Ureum 5,0

Lekobaza Lux Apteczna ad 100,0

M.f. cremor

DS. Zastosować dwukrotnie na zainfekowaną powierzchnię, preparat powinien pozostawać na skórze co najmniej 8 godzin, po tym czasie zmyć ciepłą wodą.

Kopiuje recepturę



R-11067 Maść z iwermektyną przeciwświądowa

Ivermectinum 1,0

Procaini hydrochloridum 1,0

Aqua purificata 10,0

Unguentum Cholesteroli ad 100,0

M.f. ung.

DS. Zastosować dwukrotnie na zainfekowaną powierzchnię, preparat powinien pozostawać na skórze co najmniej 8 godzin, po tym czasie zmyć ciepłą wodą.

Kopiuje recepturę



R-11065 Maść z iwermektyną

Ivermectinum 1,0

Adeps lanae

Vaselini aa ad 100,0

M.f. ung.

DS. Zastosować dwukrotnie na zainfekowaną powierzchnię, preparat powinien pozostawać na skórze co najmniej 8 godzin, po tym czasie zmyć ciepłą wodą.

Kopiuje recepturę

